


*UP





Digitized by the Internet Archive
in 2014

<https://archive.org/details/b21356397>

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

HEPATITIDE.

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS

DE

HEPATITIDE;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI Consensu;

Et NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subijcit

JACOBUS ALEXANDER MAXWELL.

CHIRURG:

SCOTUS;

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT C. STEWART ET SOCIJ,
ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.

M DCCC I.

Le M^r George Bell
with best wishes,
and most grateful thanks
for favors received,
of the Author

VIRIS OPTIMIS
GULIELMO LAIDLAW,

ARMIGERO, DE ALLANTON;

NECNON

REV. JACOBO MUIRHEAD, D. D.

SUIS CURATORIBUS;

HANC DISSERTATIONEM MED. INAUG:

SACRAM VULT

JACOBUS ALEXANDER MAXWELL:

Sub quorum tutela, consilia vere paterna ac summa beneficia accepi; quique meum commodum et studia ab ineunte aetate promovenda semper curabant; his studiorum primitias qualescunque, grati pignus animi dedico confecroque. Accipiat igitur, mihi amicissimi, hocce publicum observantiae testimonium erga vos, quae nunquam ex mea mente elabetur.—Valete.

ITEM,

BENJAMINI BELL,

CHIRURGO

PERITISSIMO ET EMINENTISSIMO,

SUB CUJUS AUSPICIIS

RUDIMENTA MEDICINAE IMBUIT,

HOC OPUSCULUM

D. D. CQUE

AUCTOR.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

HEPATITIDE.

AUCTORE JACOBO ALEX. MAXWELL.

HOC genus morborum sic variatur et definitur
à claro Cullenò :

“ I. Acuta. Pyrexia ; hypochondrii dextri tensio
et dolor, faepe pungens pleuritici instar, saepius
obtusus ; dolor ad claviculam et summum hu-
meri dextri ; decubitus in sinistrum latus diffi-
cilis ; dyspnoea ; tussis sicca ; vomitus ; singul-
tus.”

A.

II.

“ II. Chronica. Haec saepe nulla quibus dignoscatur signa praebet ; aliquando tamen eandem adeste suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam praegressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam à preffo hypochondrio dextro, vel à decubitu in latus sinistrum sensito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.”

HISTORIA.

Indicia, quae Hepatitis acuta plerumque exhibet, haec sunt : calor auctus ; arteriarum ictus frequens ; dolor tensioque hypochondrii dextri ; gravisque, morbo progrediente, febris ; pulsus durus, validus, et frequens ; dolor magis auctus, saepe pungens pleuritici instar, saepius autem obtusus, pressuque multum auctus, tendens ad claviculam summumque humeri dextri, parteque jecinis maximè dolente conveniens, plus minusve

nusve antrorsum retrorsumve spectans ; respiratio gravis et difficilis ; singultus etiamque frequens ; aeger ventriculum dolere conqueri saepe solet, quod nauseam cum vomitu plerumque bilioso inducit ; gravis interdum vigilia, deliriumque adadsumt ; aeger in latus affectum facilius cubat ; urina rubra, felle saepe tincta, solito parcius excernitur ; tussis frequens, interdum humida, saepius autem sicca urget ; vultus aegri languidus et luridus fit ; os et lingua arescunt, haec crusta plerumque albicat ; fitis gravis, ciborumque fastidium subeunt ; corpus quoque aridum et calidum tactu percipitur ; et Lommius sic ait, “ Ipse homo toto corpore calet, praecipue palmis “ et plantis pedum : quae partes etiam, si ad “ calorem siccitas accessit, inarescunt ; si humor, “ madent. Ferè autem contraria his contingunt, “ si jecur frigidior, quod rarè fit, intemperie “ labefactatur.” Alvus saepissime astringitur, tametsi in morbo acuto secretio fellis interdum multum augetur. Quidam medici regium morbum inter signa Hepatitidis enumeraverint ; experientia

perientia tamen fatis compertum habet, eam absque hoc signo saepe apparuisse.

Certior factus sum per familiarem medicum mei, qui in Honorario Indico Commercio diu versatus est, dextram etiamque summum penem, in hoc morbo laborantium, quos ipse curâisset, dolore levi ac frigore esse capta. Penis summi affectionem non observavi notatum ab ullo recenti aut vetere, qui de hoc malo scripserit; sed inter veteres, Lommius, signis jecinoris inflammati accuratissimè enumeratis, dicit, “Interdum manus quoque dextra torquetur.” Idem familiaris mecum communicavit eos, quos curâisset, posse praedicare paroxysmum se aggressurum per affectionem penis summi ingravescentem.

Signa supra dicta hunc morbum licèt fermè comitari solent, revera tamen pro varia jecinoris parte, quam inflammatio occupaverit, haud parùm variantur. Si convexam hepatis partem, ut peritonaeum, quod parietes abdominis munit, affecerit, dolor pressu auctus, aliquid tumoris in regione

regione hepatica haud vix percipiuntur : Si partem septo transverso proximam, occupaverit, dolor pleuritici instar, affectioque claviculae summi-
que humeri, magis aucta fiunt, interque spirandum intenduntur ; thoraxque doloribus in varias ejus partes vibratis laborat ; singultus et tussis magis sicca, saepius adfunt ; respiratio etiam, ob descensum septi transversi impeditum difficilior et molestior fit. Si inflammatio in parte concava sedem habeat, dolor nequidem tam multum respiratione afficitur, et vomitus biliosus saepius urget, quod forsitan phlegmasia sese ventriculo impertiverit, inde ad vesicam fellis ductusque biliarios facillimè iter faciat, et haec, ut Cullenus docet, unica species est idiopathicae hepatitidis, quae regium morbum comitem habet.

Indicia chronicae hepatitidis tam multò obscuriora existunt, quod saepissimè morbo abscessus, scirrhusve jecinoris ante finem dat, quam ulla indicia dira se ostendere coeperunt, ob eamque causam medicum ejus signa sedulò animadvertere oportet.

Si Hepatitis chronica adsit, hepaticus, ponderis,

ris, plenitudinis, sensum, hypochondrii dextri, interdum scrobiculi cordis, et regionis epigastricae dolorem levem conqueritur, pressurâ, aut in latus sinistrum cubitu magis auctum; febris levis et fugax, saepe autem paroxysmis sub luce rediens intermittentis instar invadit; diminutio virium animalium subit; aegerque faciem tumidam, languidam et luridam, jecur morbidum denotantem, in diesque magis moestitiâ foedam inducit; oculi hebescent, tunica albuginea modò flava, saepius autem exalbida fit; cutis dura et ficca percipitur; urina parciùs redditur, plus minusve rubicunda; perspiratio specialis et parca est; crura et pedes interdum tumere observantur; atque, "The gums;" Dominus Gidlestone inquit, "contract a hardness, and the shoulders appear daily more elevated;" et Lommius etiam ait, signis scirrhi hepatis enumeratis pectus atque humeri extenuantur."

Prima via per morbi hujus cursum varia est; dejectiones modò copiosae, modò parcae; aeger saepe paulo ante prandium ventriculum languescere, et haud rarò insolitum cibi desiderium sub-

inde

inde sentit, ciboque assumpto, brevi levatus videtur, citò autem cardialgia, tormina aut alia dyspepsiae signa eum invadunt; jecur quoque investigatione miram in molem interdum crevisse invenitur.

Dominus Saunders in sua celeberrima dissertatione, de Hepate, duo mala non magis a se discrepasse signis, quam variis hepatis statibus a quibus originem ducunt, literis mandavit: “ In chronic inflammation,” inquit, “ a condition obtains in some degree the reverse of the former. Instead of appearances which accompany and characterize acute and active inflammation, there are manifest signs of indolence and want of action in the circulating system. The colour natural to this organ in the healthy state, and which appears to be imparted to it from the bile, is lost; it assumes an ash or clay-coloured hue, evidently connected with a diminished secretion. This kind of liver is evidently smaller; it undergoes a change in shape; the lower edge which is naturally thin, especially the left lobe, becomes round and gibbous. If we cut
“ into

“ into its substance, we find uniformly a solid
 “ compact appearance, interspersed with foramina, evidently the orifices of divided vessels ;
 “ but if we compare the cut surface of a diseased
 “ liver with that of a healthy one, we observe a
 “ very sensible difference, the latter being much
 “ more porous than the former.”

TERMINATIONES

Eaedem huic morbo, ac aliis inflammationibus,
 Resolutio nimirum, Suppuratio, Scirrhus et
 Gangraena, sunt.

RESOLUTIO

Quoties hepatitide finem ponit, aliqua eva-
 cuatio aucta plerumque antecedit ; puta diarrhoea ; per-
 spiratio ubera ; fluxus urinae saepe auctus, copi-
 osum sedimentum deponentis ; erysipelas non-
 nunquam

nunquam externa ; saepe sanguinis è naribus aut vasis haemorrhoidalibus profluvium ; expectoratioque libera, Culleno auctore, hoc malum resolutione saepe finit ; exsudatio, ut quidam putant à superficie jecinoris inflammati, cui adhesiones partium vicinarum medici assignant, etiamque id saepe abstulit.

SUPPURATIO.

Tempus mali hujus, ex vi inflammationis, ratione medendi adhibitâ, tempestate anni, qualitate coeli, denique aetate aegri et temperamento, multùm pendet.

Sensus ponderis et gravitatis hypochondrii dextri; horrores frequentes ; vultus rubore suffusus ; ad sudorem proclivitas ; pulsatio saepe percipienda, purisque fluctuatio ; febris sub luce ingravescens, certò eam indicant. Lommius inquit:
“ Haud rarò morbus, ubi non solvetur, suppu-
“ rat, oriturque abscessus prorsus exitialis. Is ubi
“ jam flere incipit, febres increfcunt et dolores
B “ nihilque

“ nihilque feré de loco affecto defluit : decubi-
“ tus in omnem partem corporis molestus est ;
“ ipse aeger, saepe sine ordine, sine certa causa
“ inhorrescit, moxque majoribus caloribus urge-
“ tur ; factoque pure, dolores quidem ardoref-
“ que minuuntur : at homo longè fit imbecillior,
“ id quod pulsû frequenti parvo ac languido,
“ crebrâque animi defectione cognoscitur. Haec
“ defectio, ubi rupto abscessu pus effluit, incre-
“ bescit, et penè in syncopen transit, ex quo casu
“ vix unquam quisquam fuit.”

Quando abscessus formetur, pus variè foras eliminetur, prout diversis partibus inflammatio adhaeserit. Si pars inflammata peritoneo abdomen succingente sit adjuncta, tumore ac fluctuatione indicibus, per parietes pus cultro eliciatur. Si septo transverso adnexa sit, formatum in thoracis cavum irrumpatur, et ita suffocatio infertur. Si abscessus concavam hepatis partem occupaverit, complexis ductibus biliariis eorumque tunicis corrofis, materia purulenta facilè in intestina ingredi potest ; aut si colo imum jecur serpenti insiderit, deinde pus ano evacuatum sit, aut in abdominis

abdominis cavum erumpat, et si non brevi infelix fit, morborum non minus infelicium fundamenta jacet.

SCIRRHUS.

In scirrhum jecinoris obfirmatum hepatitis vetusta saepiùs quàm acuta definit. Vultus aegri multum mutatur; modo flavidus, modo pallidus, et moestitiâ foedus; saepiùs autem propriè luridus morbidum jecur significans apparet.

Quidam molem jecinoris multum minui scirrho tradunt; certò autem saepiùs augetur; Prof. Gregorius memorat se hepar octodecim librarum vidisse.

GANGRAENA.

Hepar licèt in gangraenam rariùs quàm ulla corporis viscera abire solet, quaedam autem exempla misera extitisse accepimus, et Saunderius
sic

fic ait : “ I have seen some cases where the
 “ pain and inflammation have subsided very sud-
 “ denly, and have been succeeded by a low flut-
 “ tering pulse, cold extremities, and death ; so
 “ that there has been reason to suspect, that
 “ this may, on some occasions, though much
 “ less frequently than others, become gan-
 “ graenous.”

CAUSAE REMOTAE.

Inter plerosque medicos satis constat hunc morbum adolescentulos aut impuberes rarius invadere, tametsi causis admodum excitantibus obnoxios.

Qui aetate florente, temperatura sanguinea sunt ; qui ex frigida ad regionem calidam se conferunt ; qui sibi indulgent carnibus, spiritibusve valdè fermentatis in hepatidem acutam propensiores existere ; ac quibus vires morbo aliisve modis multùm fractae aut minutae sunt ; aut quibus animi rebus adversis multùm depressi ;

aut

aut melancholici, chronicae magis opportunos esse quoque asseritur.

Inter causas remotas praecipuè sunt, regiones calidae, vel calor perennis; febres putridae, intermittentes aut remittentes; hydrargyrus nimis; ardentium spirituum intemperantia; radii solis; nimia corporis exercitatio, eique calido frigus intrinsecus potu gelido admotum, aut extrinsecus aëre frigido et humido, aut sub diopernoctando; et cum morbus à frigore originem ducit, cel. Cullenus observavit, pneumoniam comitem saepe habere; regioni hepatis aut capiti vis aliqua externa illata; vultus ille languidus, luridus, et melancholicus, qui huic morbo semper adfit, et aucta secretio fellis iracundiâ orta, magnum consensum inter jecur et caput valdè demonstrant, quo fit, ut animi affectus, maximè graviores, hepatitidis causae remotae sunt. Chronica phlegmasia jecinoris morbum acutum interdum induxîsse fertur, et, vice versâ, acuta induxîsse chronicum. Feminae, licèt magis plethoricae quàm homines, inflammationibus minus obnoxiae sunt.

RATIO SIGNORUM.

Hypochondrii dextri tensio et dolor, morbo sedenti lobo magno hepatis hypochondrium dextrum et partem regionis epigastricae occupanti, tribuuntur.

Pungens pleuritici instar, parti hepatis convexae septo transverso proximae inflammatae, et inde pleura leniter affecta, tribuitur.

Dolor ad claviculam et summum humeri dextri, eâdem ratione exponitur, tenui inflammationi nimirum, septi transversi, cum mediastino communicatae et ad claviculam et summum humeri dextri serpenti ascribitur. Quidam, nexui nervorum quem phrenicus cum illis summi humeri habet, fortasse rectius assignant.

Hic nervus de ramo ex tertio et quarto cervicalibus compositus est, et thoracem inter venam et arteriam subclavianam ingreditur, et per striam pericardii, ad septum transversum descendit. Recens Monro, in sua eximia dissertatione de nervis, utitur ;

his verbis utitur ; “ The other branches of the
 “ third cervical nerve are distributed to the mus-
 “ cles and integuments of the lower part of the
 “ neck and top of the shoulder ; no wonder then
 “ that an inflammation of the liver or spleen or an
 “ abscess of the lungs, adhering to the diaphragm
 “ should be attended with a sharp pain on the
 “ top of the shoulder.” Hâc ratione dolorem
 exponitu facillimum est ; nam si ab inflamma-
 tione ad partes communicata oriatur, quare in
 pueumonia et aliis inflammationibus thoracis non
 adfit ?

Decubitus in sinistrum latus difficilis ; jecur,
 quod dextram et superiorem partem abdominis
 tenet, incumbendo in latus sinistrum à sede
 naturali nonnihil amovebitur, ideóque ligamento-
 rum tensione, cùm inflammatio adfit, gravis dolor
 infertur.

Dyspnoea, descensui septi transversi impedito,
 aut jecinore in mole aucto, aut pressurâ sub con-
 tractione in jecur inflammatum ; aut actioni septi
 transversi ipsius inflammati, tribuitur.

Tussis et Singultus, septo transverso in irregu-
 lares

lares contractiones inflammatione aut irritatione immisso tribuitur; et cl. Monro, in dissertatione jam dicta, etiam inquit, “ If the irritation of this
 “ muscle is very violent, it may occasion that
 “ convulsive contraction of the diaphragm
 “ which is called hiccough.”

Vomitus, ab inflammatione ad ventriculū communicata, aut à miro consensu, qui inter ventriculū et omnes partes corporis existit; aut secretionē fellis auctā, quae saepe morbo acuto adfit, oriatur.

DIAGNOSIS.

Morbi, quibus hepatitis vulgò confunditur, sunt, dyspepsia, pneumonia, inflammatio ventriculi, et rheumatismus partium vicinarum.

A dyspepsia, gravi dolore hypochondrii dextri levi pressurā percipiēdo, ad claviculā et summū humeri ejusdem lateris spectante, vultu lurido, febre, oculis languidis et hebetibus, denique auxilio, quod datur aegro sanguinem mittendo,

tendo, qui simul emissus tunicam coriaceam albam inducit, facillè dignoscitur.

A pneumonia Hepatitis fecernitur, dolore, in illa, quidem, multò graviore, ad claviculam et summum humeri dextri nunquam tendente, sedemque altiore in thorace semper figente, et decubitu in latus affectum multò aucto; in hepatitis autem, aeger in latus affectum multo faciliùs cubat; respiratio non tam molesta; pneumonia denique in regionibus calidis rara est, hepatitis, contrà, in his saepissimè observatur.

Hepatitis à rheumatismo facillè dignoscitur, nam in hoc febris levior est, dolorque fugax cum juncturarum aliis alternans.

In gastritide, dolor et calor magnus, quolibet in ventriculum assumpto insignis est, et vomitus repentinus subinde urget, et magna debilitas; quae omnia in hepatitis diversae sunt.

PROGNOSIS.

Haec ex vi et diuturnitate morbi, ex aetate et temperamento aegri deducenda est. Si morbus in stadio inflammationis sit, et aeger bonâ temperaturâ praeditus, eventus felix expectandus est; si magnâ macie confectus, et vires extenuatae morbo, aliisve modis, malum est; abscessu formato, omnis spes salutis ferè desperanda est, nisi tumor aut fluctuatio percipi possunt, quae indicant quo modo pus foras cultro eliciatur; si chronica facta est, et hepaticus in regione calida diu commoratus, haud bonum fit, namque primae viae ferè tam debilitatae ac turbatae, ut propria remedia ferre nequeant.

MODUS MEDENDI.

In morbo acuto, proclivitati jecinoris ad supurationem et ejus diros terminos, efficacissima
remedia

remedia obviam ire adhibenda sunt. Hic regimen, antiphlogisticum vulgò vocatum, accuratè utendum est; namque, ex eo, sanatio multùm pendet; sanguis detrahitur prout vires aegri, dolor, aut febris postulet; vesicatoria parti dolenti apponi debent, et haec iterata, aut ad partes vicinas adhibita, utiliora inveniuntur; fomentationes calidae, ad partem dolentem, quoque utiles sunt; et si inflammatio superficiem hepatis concavam occupaverit, utque huic colon sit ad-junctum, lotiones calidae emollientes anum injectae, multùm proderunt; laxativa magno commodo administrantur, et ex his sales neutri, ut qui corpus refrigerant, optimè inserviunt; refrigerantia commodè praecipiantur, haud enim dubium videtur, quin ad curandum conferant; actionem totius corporis minuendo, et ex his, acida vegetabilia nativa, citras et nitras potassae, optimè inserviunt; diaphoretica et diluentia saepe eodem concilio adhibentur.

Quoties morbus resolutione finitur, aliqua evacuatio aucta et diminutio signorum eam certè indicant; sin hoc non paucis diebus contingit,
omnia

omnia remedia, supra dicta, seponi debent, ut corpus debilitent, et sic malorum dirorum origo fiunt; et hydrargyrus, (quod multis placet) confestim adhibendus est, qui suppurationi efficacissimè occurrere potest. In regionibus calidis, ubi malum multo frequentius, et ejus cursus velocior, quam in frigidis, est, presens hydrargyri usus, modo signis gravissimis levatis, ac laxativo adhibito, multum commendatus est. (Quod ad hoc remedium efficacissimum administrandum pertinet, varium est inter medicos.) Modus autem adhibendi muriatem hydrargyri dulcem internè, et unguentum hydrargyri ad partem affectam, aut femina, aut ad partes fricandas, quâ citissimè in massam sanguinis circumeuntem delatum sit, causa salivae leniter movendae, mihi videtur, antiponendus est. Si hoc fieri potest, priusquam quid puris formetur, remedium potentissimum et tutum evadet.

A multis remedium speciale in hac affectione sananda hydrargyrus quidem habitus est; res autem nequaquam se habet, namque in casibus quibusdam, Domino Dick, Calcuttae, testante,

sine

sine fructu fuit usurpatus ; idem auctor, qui omnes varias formas et stadia hujus morbi vidit, his verbis utitur ; “ In chronic cases where there
“ is no fever, but only an obtuse pain in the side
“ and shoulder, with a fulness in the side, and
“ about the pit of the stomach, keeping up a
“ constant uneasiness, mercury seems to me to
“ have but little good effects ; when used freely,
“ it removes the symptoms at the time, but they
“ generally return as soon as the mercury is left
“ off. Having been repeatedly baffled in this
“ way, and observing very often that such
“ liver attacks succeeded long courses of mer-
“ cury, undergone for the cure of venereal
“ complaints, I have, for several years past, trust-
“ ed to a seton or issue made in the side, and
“ with success far beyond my expectations.”

Quoties à febre putrida intermittente aut remittente morbus oriatur, diathesis putrida potius quam phlogistica comitari videtur. Hic tonicis et antisepticis, præcipuè cortici cinchonae, vino rubro, dietæ nutrienti, et exercitationi leni, plerumque cedit.

Ut affectio chronica ex debilitate magis quam aucta vasorum jecinoris actione pendet; huic remedia supra dicta unà cum hydrargyro maximè accommodata sunt.

Dominus Scott, medicus ingeniosus, Bombaiae, acidum nitricum ad scirrhum aut affectionem chronicam jecinoris sanandam, maximè laudavit; et nos certiores facit, id contra mala ejusmodi saepe valuisse, qua hydrargyrus planè non potuit.

Si dolor lateris gravis sit, oportebit ut fomentationes calidae, et lotiones anum injectae, adhibeantur, quae votis plerumque respondebunt.

Tussis et singultus, modo saepe adsunt, irritationem septi transversi et oesophagi gravem demonstrant; opiumque internè sumptum aegro subsidio fit.

Si vomitus urget, opium vel anò vel ore adhibitum, ad hunc praeveniendum saepe sufficit; haustusque effervescentes idem commodum etiam pollicientur.

Astringentia, modo diarrhoea adsit, non dari debent

debent, nisi magnâ debilitate periclitatur, et si opus est, opium anteferendum videtur.

Si alvus tardior sit, lenibus cathartorum dosibus cieri oportet, et tartris potassae duplici consilio etiam imperetur; namque Dominus Hope, in suis praelectionibus clinicis, ait, “non modo pollent sicut laxativa, sed etiam obstructiones viscerum perpurgant.”

Quando dyspepsia huic morbo superadditur plerumque ex debilitate oritur, ac tonica et stimulantia multum profuerint, è quibus, haec Dominus Hope, in praelectionibus supra dictis, dicit, “cum primum adhibita instans auxilium ferunt, saepe autem iterata ventriculum debilitent, ob eamque causam non diu continuari debent.”

Tonica quam stimulantia utiliora sunt, et ex his optima, cortex cinchona, aquae minerales, chalybetes, exercitatio modica, et amara; haec autem, Hope auctore, diu continuata ventriculum debilem reddant.

F I N I S.



7-2-24

⑧





